

پژوهشی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
جلد دوم، شماره سوم و چهارم، تابستان و پاییز ۱۳۸۲

کارایی روش برش انجمادی در تشخیص ماهیت ندولهای تیروئیدی

شعبان مهرورز^۱، سید مسعود خاتمی^۲، سامان خوشینی^۳، جلال نژادسنگسری^۴

خلاصه

سابقه و هدف: مطالعه بافت تیروئید در حین عمل جراحی توسط آسیب شناسان به روش تهیه برش انجمادی (FS) انجام می‌شود و این کار علاوه بر افتراق بین توده‌های خوش‌خیم و بدخیم می‌تواند از گسترش بی‌مورد عمل جراحی و یا از انجام عمل جراحی مجدد جلوگیری کند، در دو دهه گذشته بتدریج از نقش آن در تعیین ماهیت ندولهای تیروئید کاسته شده است و استفاده از آسپیراسیون با سوزن نازک (FNA) جایگزین آن گردیده است، هدف از این مطالعه بررسی کارآیی و نقش این روش در تشخیص صحیح ماهیت ندولهای تیروئیدی و مقایسه آن با مطالعات دیگر بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته‌نگر تعداد ۸۴ نفر (۶۷ زن و ۱۷ مرد) از بیماران مورد مطالعه قرار گرفتند که به دلیل داشتن ندولهای تیروئیدی تحت عمل جراحی تیروئیدکتومی قرار گرفته و در حین عمل جراحی نمونه تیروئید آنها به روش بافت شناسی انجمادی مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین سن این بیماران ۳۶ سال (حداقل ۱۵ و حداکثر ۷۰ سال) بود.

یافته‌ها: براساس گزارش آسیب شناسی نهایی در این بیماران ۱۲ مورد (۱۴/۳ درصد) سرطان تیروئید و ۷۲ مورد (۸۵/۷ درصد) به انواع بیماریهای خوش‌خیم تیروئید مبتلا بودند و شیوع بدخیمی در بین مردان ۲۹/۴ درصد و در بین زنان ۱۰/۴ درصد بود. با مقایسه گزارش برش انجمادی (FS) با نتایج آسیب شناسی نهائی، تعداد ۴ مورد (۴/۷ درصد) از گزارشات نادرست (۲ مورد مثبت کاذب و ۲ مورد کاذب)، و بقیه ۸۰ مورد (۹۵/۳ درصد) از گزارشات صحیح بودند. میزان حساسیت و اختصاصی بودن این روش بترتیب ۸۳٪ و ۹۸٪، ارزش اخباری مثبت (P.P.V) و ارزش اخباری منفی (N.P.V) این روش به ترتیب ۸۳٪ و ۹۸٪ بود.

نتیجه گیری: استفاده از برش انجمادی به عنوان ابزاری دقیق در تعیین موارد مشکوک یا مبهم (FNA) توصیه می‌شود به طوری که از گسترش بی‌مورد عمل و صرف هزینه و وقت اضافی یا انجام عمل جراحی مجدد جلوگیری می‌کند.

واژه‌های کلیدی: ندولهای تیروئید - برش انجمادی، تیروئیدکتومی، سرطان تیروئید

مقدمه

۱- استادیار گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، دانشکده پزشکی (نویسنده مسئول)

۲- دانشیار گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...، دانشکده پزشکی، متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی عروق

۳- استادیار جراحی، متخصص جراحی عمومی

۴- متخصص جراحی عمومی

[۱۴، ۷، ۵] و همگی از قابلیت اعتماد^۴ بالاتر از ۹۵٪ این روش حکایت دارند، [۱۴، ۱، ۲] و این در حالی است که در محدودی گزارشات این روش را غیر دقیق و یا غیر ضروری دانسته و قابلیت اعتماد آن را پائین می‌دانند [۱۲، ۲] و شاید به همین دلایل باشد که در یک مطالعه مروی انجام شده در انگلستان اعلام شده که در خصوص استفاده از برش انجام‌دادی (FS) در FNA حین عمل جراحی استقبال چندانی نشده و اغلب از استفاده می‌شود [۴]، اما در همین مطالعات به اندیکاسیون استفاده از برش انجام‌دادی (FS) در تشخیص افتراقی آدنوم فولیکولر و هارتسل از نوع سرطانی آنها و همچنین به مواردی دیگر که FNA نتوانسته است نتیجه تشخیصی دقیقی را بدست آورد [۱۳، ۷] اشاره شده است؛ مطالعات دیگری نیز انجام شده است که در آنها استفاده از FNA به عنوان یک ابزار تشخیصی اولیه قبل از عمل جراحی ذکر شده است و توصیه شده که با انجام برش انجام‌دادی (FS) حین عمل جراحی علاوه بر تأیید تشخیص، برای موارد مشکوک را هم تعیین تکلیف نمود و در این مطالعات آمده است که با انجام این کار توانسته‌اند از گسترش بی مورد عمل جراحی جلوگیری کرده و همچنین موارد اعمال جراحی مجدد ناشی از اشتباہات احتمالی را کاهش دهند و به علاوه در وقت و هزینه‌های عمل جراحی نیز صرفه جوئی کنند [۱۲، ۵].

از آنجا که در کشور ما پاتولوژیست‌ها با روش انجام FNA و نحوه خواندن آن به طور کامل آشنایی نداشتند و نتایج گزارش FNA نیز در موارد زیادی قاطعیت کافی را ندارد از سوی دیگر برش انجام‌دادی (FS) یک روش شناخته شده برای آنها و جراحان می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارزش روش FS در مقایسه با پاتولوژی نهایی و مقایسه آن با آمارهای خارجی بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه ابتدا پرونده کلیه بیماران تیروئید کتونی شده در بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) تهران در طی ۵ سال (۱۳۷۳-۷۸) مورد بازنگری قرار گرفت که در بین آنها آن دسته از بیمارانی که در حین عمل جراحی بروی نمونه

در گذشته استفاده از برش انجام‌دادی (FS)^۱ به عنوان یک روش قابل اعتماد مورد استفاده اکثر جراحان بود ولی در حال حاضر استفاده از آن محدود به مواردی است که آسپیراسیون با سوزن نازک (FNA)^۲ نمی‌تواند پاسخ قطعی در مورد ماهیت ندول ارائه کند و یا نتیجه FNA منفی از نظر کلینیکی با وضعیت بیمار مطابقت نکند، در این شرایط جراحان مجبور به استفاده از ابزار دقیق و قاطعی هستند که در حین عمل جراحی علاوه بر تشخیص ماهیت ندول بتواند به آنها در گسترش یا محدود نمودن عمل جراحی نیز کمک کند که البته این ابزار برش انجام‌دادی (FS) می‌باشد [۱۳، ۱۲].

در مطالعات دو دهه اخیر بخصوص در ۱۰ سال گذشته مقایسه ارزش این دو روش تشخیصی و همانطور ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها بشدت مورد توجه و موشكافی بوده و هزاران مطالعه در نقاط مختلف جهان انجام شده است و آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است تأکید بر ضعف تشخیص FNA در افتراق آدنوم فولیکولر و هارتسل از موارد سرطانی آنهاست و نکته بعدی این که گاهی اوقات با این روش نمونه کافی به منظور اظهار نظر قطعی بدست نمی‌آید که در مجموع حدود ۳۰ درصد موارد را تشکیل می‌دهند، و همانطور که گفته شد در اینجا استفاده از برش انجام‌دادی (FS) به عنوان یک ابزار با دقت بالا به جای FNA توصیه شده است [۱۱، ۱۰، ۹]. همانطور که بیان شد اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام شده است حاکی از ارزش بالای تشخیص این دو روش بوده‌اند و سایر روش‌های تشخیصی دیگر مانند سونوگرافی و یا اسکن ایزوتوپ در تشخیص سرطان تیروئید از ارزش تشخیصی بالائی برخوردار نبوده و استفاده از آنها در موارد خاص دیگری توصیه شده است.

حساسیت و اختصاصی بودن و قابلیت اعتماد برش انجام‌دادی (FS) و آسپیراسیون با سوزن نازک (FNA) مهمترین مواردی بوده‌اند که در اکثر مطالعات به آنها توجه شده است و شاید ممتازترین نکته در مورد برش انجام‌دادی (FS) اختصاصی بودن این تست برای تشخیص سرطان می‌باشد و در مطالعات زیادی هیچ موردی از مثبت کاذب^۳ گزارش نشده است

1- Frozen Section

2- Fine Needle Aspiration

3- Flase Positive

روش ۸۳٪ و میزان اختصاصی بودن آن ۹۸٪ محاسبه می‌شود (جدول ۱).

جدول ۱: مقایسه نتایج برش انجمادی با پاتولوژی نهایی

تعداد کل	فروزن		گزارش پاتولوژی نهایی
	بدخیم	خوش خیم	
بدخیم			
۱۲	۱۰	۲	تعداد
%۱۰۰/۰	%۸۳/۳	%۱۶/۷	درصد پاتولوژی نهایی
%۱۴/۳	%۸۲/۳	%۲/۸	درصد فروزن
%۱۴/۳	%۱۱/۹	%۲/۴	درصد از کل
خوش خیم			
۷۲	۲	۷۰	تعداد
%۱۰	%۲/۸	%۹۷/۲	درصد پاتولوژی نهایی
%۱۴/۳	%۱۶/۷	%۹۷/۲	درصد فروزن
%۸۵/۷	%۲/۴	%۸۳/۳	درصد از کل
کل			
%۸۴	۱۲	۷۲	تعداد
%۱۰۰/۰	%۱۴/۳	%۸۵/۷	درصد پاتولوژی نهایی
%۱۰۰/۰	%۱۰۰/۰	%۱۰۰/۰	درصد فروزن
%۱۰۰/۰	%۱۴/۳	%۸۵/۷	درصد از کل

توضیح: عبارت Total بیانگر نتایج قطعی براساس پاتولوژی نهایی (permanent) می‌باشد که مورد قضاوت نهایی قرار گرفته است و همانطور که ملاحظه می‌شود فقط دو مورد مثبت کاذب و دو مورد منفی کاذب در کل ۱۶ مورد وجود داشته است.

ارزش اخباری مثبت (P.P.V) و ارزش اخباری منفی (N.P.V) آن نیز به ترتیب ۸۳٪ و ۹۸٪ می‌باشد.

بحث

انجام برش انجمادی (FS) به عنوان یک روش تشخیصی بافتی حین عمل جراحی از دقت بالایی در تشخیص موارد سرطان می‌باشد و قابلیت افتراق خوبی در این جهت دارد و

تیروئید آنها به روش برش انجمادی (FS) مطالعه آسیب شناسی انجام شده بود، مشخص شدند (۸۴ نفر)، و پس از خلاصه برداری و ثبت اطلاعات آنها در فرمهای مخصوص با نتیجه پاتولوژی نهایی آن مقایسه گردید و بعد بررسی این اطلاعات بوسیله نرمافزار SPSS محاسبات آماری انجام گردید. در این مطالعه، نمونه آسیب شناسی نهایی^۱ به عنوان مرجع در نظر گرفته شد و تمامی لامهای بیماران توسط همکاران پاتولوژیست همین مرکز مورد مطالعه قرار گرفته بودند.

نتایج

در بین ۸۴ نمونه بافتی (۶۷ زن و ۱۷ مرد) مورد مطالعه، ۱۲ مورد کانسر گزارش شد که این تعداد بیانگر وجود ۱۴/۳ درصد بدخیمی در بین بیماران تیروئیدکتومی شده بود و در این میان ۵ نفر مرد و ۷ نفر زن بودند که درصد بروز بدخیمی بین زنان ۱۰/۴ درصد و بین مردان ۲۹/۴ درصد بود. میانگین سنی کل بیماران $۳۶ \pm ۱۰/۲$ سال (بین ۱۵ تا ۷۰ سال) بود ولی میانگین سنی بین بیماران مبتلا به بدخیمی ۳۵±۱۲/۵ سال و در بین بیماران مبتلا به بیماریهای خوش خیم $۳۶ \pm ۹/۹$ سال بود.

از نظر عملکرد تیروئید ۵ نفر از بیماران از نظر آزمایشگاهی هیبرتیروئید بودند که همگی زن بوده و هیچکدام مبتلا به بدخیمی نبودند و ما بقی دارای عملکرد تیروئید طبیعی^۲ بودند.

نتایج حاصل از مقایسه مطالعه آسیب شناسی دائمی با نتیجه برش انجمادی (FS) در جدول ۱ آمده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود تعداد ۴ مورد اشتباه (۲ مورد مثبت کاذب و ۲ مورد منفی کاذب) در این مطالعه وجود داشت که بر این اساس از بین موارد گزارش شده بوسیله برش انجمادی (FS)، ۹۵/۳ درصد گزارشات صحیح و ۴/۷ درصد موارد اشتباه تلقی می‌شود و این میزان اشتباه در تشخیص با توجه به تعداد در کل موارد بدخیمی نسبی ۱۲ نفر $۱۶/۷$ درصد موارد بدخیم را تشکیل می‌دهد. میزان حساسیت این

3- Positive Predictive Value
4- Negative Predictive Value

1- Permanent
2- Euthyroid

براساس این مطالعه و مقایسه با سایر مطالعات انجام شده، متوجه می‌شویم که این ابزار به همان قدرت و ویژگی که در سراسر دنیا مورد استفاده است، در اختیار ما و همکاران قرار دارد و این نتایج قطعاً ناشی از همکاری نزدیک و دقیق بین پاتولوژیست و جراح بست آمده و می‌تواند در آینده نیز بهبود یابد و در جدول ۲، بعضی از نتایج حاصله از این مطالعه با سایر مطالعات مقایسه شده است.

تعداد کم موارد مثبت کاذب از ویژگیهای مهم برش انجمادی (FS) می‌باشد و این در مطالعه ما حاوی ۲ مورد مثبت کاذب بود که قابل تأمل می‌باشد (جدول ۲).

جدول ۲: مقایسه مطالعه ما با سایر مطالعات درباره موارد مثبت کاذب و قابلیت اعتماد
Frozen Section

جدول ۳ - مقایسه مطالعات مختلف درباره حساسیت و اختصاصی <i>Frozen Section</i> بودن			
نویسنده	تعداد بیماران	اختصاصی بودن	حساسیت
Taneri F (15)	۳۷۷	% ۹۹	% ۸۲/۲
Aguilar M (1)	۳۲۶	% ۱۰۰	% ۵۰
Keller MP(8)	۴۶	% ۹۷	% ۶۰
Kingston FW(9)	۳۹۵	% ۱۰۰	% ۵۲
Boyd LA(2)	۱۰۱	% ۹۹	% ۸۶
This study	۸۴	% ۹۸	% ۸۳

- اعداد داخل پرانتز شماره منابع می‌باشد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود میزان حساسیت این روش در مطالعات مختلف بسیار متغیر بوده است ولی در مرکز ما در مقایسه با سایر مراکز از درصد بالائی برخوردار بوده است. ولی همان‌طور که بیان شده میزان اختصاصی بودن این روش نزدیک به صدر درصد می‌باشد.

استفاده از برش انجمادی در حین عمل جراحی تیروئیدکتومی، روشی است که دقت و حساسیت بالائی دارد هر جا که FNA دارای نقاط ضعف تشخیصی باشد این روش قادر به پوشش این ضعف می‌باشد و از آنجا که تعداد موارد تشخیص‌های غیرقطعی^۱ و مشکوک^۲ حدود ۳۰ درصد موارد را تشکیل می‌دهند، ما توصیه می‌کنیم که در برخورد با این گونه موارد حتماً از این روش استفاده شود و اهمیت این نکته از آنجا بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در حدود یک چهارم این موارد مبتلا به سرطان می‌باشند و کشف این ضایعات بدخیم می‌تواند علاوه بر تعیین محدوده عمل جراحی، از انجام عمل جراحی مجدد جلوگیری کرده و یا از گسترش بی‌مورد عمل جراحی بدلیل ندانستن ماهیت ندول تیروئید جلوگیری کند [۵،۱۲] در ضمن توصیه می‌شود در مواردی که نتیجه FNA مبنی بر بدخیمی است از انجام *Frozen Section* خودداری شود و نتیجه FNA از این نظر قابل قبول تلقی می‌شود [۳،۷].

نویسنده	تعداد بیماران	قابلیت اعتماد	تعداد مثبت کاذب
Chang HY (5)	۵۸۶	% ۹۸	۰
Erosy E (7)	۱۰۰	---	۰
Shaha AR (14)	۳۰*	% ۹۵	۰
Richards(12)	۱۴۰	% ۹۰	۰
This study	۸۴	% ۹۵/۳	۲

* تمام این بیماران در FNA مشکوک به بدخیمی بوده‌اند.

- اعداد داخل پرانتز شماره منابع می‌باشد.

اختصاصی بودن^۱ این روش در تشخیص سرطان شاید ممتازترین ویژگی آن محسوب می‌شود زیرا در بعضی از مطالعات این میزان ۱۰۰٪ گزارش شده [۱،۳] و در بعضی از مطالعات دیگر در حدود ۹۹٪ تا ۹۷٪ گزارش گردیده است [۲،۸،۱۵]

این موضوع خود انعکاسی از تعداد کم مثبت و منفی کاذب می‌باشد و به همین منظور میزان حساسیت و اختصاصی بودن این روش را در چند مطالعه مورد مقایسه قرار داده‌ایم (جدول ۳)

منابع

- [1] Aguilar-Disdado M, Contreras A, Garcia- Curiel A, et al: Thyroid nodules. Role of fine-needle aspiration and intraoperative frozen section examination. *Acta Cytol.* 1997; 41(3): 677-82.
- [2] Boyd LA, Earnhardt RC, Dunn JT, Frierson HF, Hanks JB: Preoperative Evaluation and predictive value of fine-needle aspiration and frozen section of thyroid nodules *J Am Coll Surg* 1998; 187(5): 494-502.
- [3] Caraci P, Aversa S, Mussa A, Pancani G, Ondolo C, Conticello S: Role of fine-Needle aspiration biopsy and frozen section evaluation in the surgical management of thyroid nodules. *Br J Surg*, 2002; 89(6): 797-801
- [4] Chadwick DR, Harrison BJ: The role of fine-needle aspiration cytology and frozen section histology in management of differentiated thyroid cancer: the UK experience. *Langenbecks Arch surg* 1998; 383(2):164-6.
- [5] Chang HY, Lin JD, Chen JF, et al. Correlation of fine needle aspiration cytology and frozen section biopsies in the diagnosis of thyroid nodules. *J Clin Pathol* 1997; 50(12): 1005-9.
- [6] Crowe PJ, Chetly R, Dent DM: Thyroid frozen section:flawed but helpful. *Aust N Z J surg* 1993; 63(4): 275-8.
- [7] Erosy E, Taneri F, Tekin E, Poyraz A, Cihan A et al: Preoperative fine-needle aspiration cytology versus frozen section in thyroid surgery. *Endocr Regul* 1999; 133 (3): 141-4.
- [8] Keller MP, Crabb MM, Norwood SH: Accuracy and significance of fine-needle aspiration and frozen section in determining the extent of thyroid resection. *Surgery*. 1987; 101(5): 632-35.
- [9]. Kingston Gw, Bugis SP, Davis N: Role of frozen section and clinical parameters in distinguishing benign from malignant follicular neoplasms of the thyroid. *Am J Surg.* 1992; 164(6): 603-5.
- [10] McHenry CR, Rosen IB, Walfish PG, Bedard Y: Influence of fine- needle aspiration biopsy and frozen section examination on the management of thyroid cancer. *Am J Surg.* 1993; 166(4): 353-6.
- [11] Neale ML, Delbridge L, Reeve Ts, poole AG: The value of frozen section examination in planing surgery for follicular thyroid neoplasms. *Aust N Z J surg.* 1993; 63(8): 610-13.
- [12] Richards ML, Chisholm R, Bruder JM, Strodel WE: Is thyroid frozen section too much for too little? *Am J Surg.* 2002; 184(6): 510-14 discussion 514.
- [13] Sabel MS, Staren ED, Gianakakis LM, Dwarakanathan S, Prinz RA: Use of fine-needle aspiration biopsy and frozen section in the management of the solitary thyroid nodule. *Surgery* 1997; 122(6): 1021-6; discussion 1026-7.
- [14] Shah AR, DiMaio T, Webber C, Jaffe BM. Intraoperative decision making during thyroid surgery based on the result of preoperative needle biopsy and frozen section. *Surgery*. 1990; 108(6): 964-7 discussion 970-1.
- [15]. Taneri F, Poyraz A, Tekin E, Ersoy E Dursun A: Accuracy and significance of Fine-Needle Aspiration Cytology and Frozen Section in Thyroid Surgery. *Endocr Regul* 1998; 32(4): 187-191.

Frozen Section Efficiency in Determination of Thyroid Nodules

S. Mehrvarz^{*1} MD, S.M Khatami²MD, S Khosheini³ MD, J Nejad Sangsari⁴ MD

Background: This retrospective study was undertaken to assess frozen section accuracy in patients undergoing Thyroidectomy.

Background: During thyroid operations, excised tissue studied via frozen section by a pathologist can differentiate benign lesions from a malignant ones and help guide the surgeon during the procedure. In recent decades the role of frozen section in defining the nature of thyroid nodules has been declining, being replaced by fine needle aspiration (FNA) despite the fact that in many cases the diagnosis may be missed. In many instances frozen section may be more reliable especially when experienced pathologists are not at hand or when preoperative FNAs are inconclusive or suspicious for malignancy.

Materials and Methods: This retrospective study included 84 patients undergoing thyroidectomy in 5 years. There were 17 males and 67 females. Mean age was 36 years (ranging from 15 to 70 years). All patients had thyroid nodules and underwent thyroideectomy at our medical center. Frozen sections from tissue samples excised during operation were evaluated for all patients.

Results: According to histopathological exam, there were 12 (14.3%) thyroid cancers and 72(85.7%) benign thyroid diseases. Incidence of malignancy was 29.4 % in men and 10.4% in women. When compared with final pathology reports, frozen section reports were correct in 95.3%. There were two false negative and two false positive reports (4.7%). Sensitivity and specificity of this method were 83% and 98% respectively. Positive predictive value and negative predictive value were 83% and 98% respectively.

Conclusions: Frozen section is a reliable and valuable method for surgeons involved in thyroid surgery and may be preferred over FNA when experienced pathologists are not at hand or when preoperative FNAs are inconclusive or suspicious for malignancy.

Keywords : Frozen Section, Thyroid Nodules, Thyroidectomy, Thyroid Cancer.

*** Corresponding author tel:** (021) 8033539

Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences and Health Services, 2003, 2(3,4):